



Maraîchage Tout Herbe #4

Itinéraires techniques



Vous avez dit Maraîchage Tout Herbe ?

Ici, on parle d'utiliser les fauches de prairies permanentes comme paillage et source de fertilité pour une ferme maraîchère autonome et résiliente.

Pour quelles cultures ?

Potentiellement, **toutes les cultures non semées** peuvent être paillées et fertilisées avec de l'herbe, même les plus exigeantes. Des essais sont en cours par des maraîchers sur des cultures semées.

Voici une liste non exhaustive des cultures qui ont fait leurs preuves : céleri, courges, choux, pommes de terre, tomates, concombres...

L'irrigation en MTH


L'herbe va se dégrader et libérer des nutriments **uniquement si elle reste humide**, il est donc important de mettre au point un système d'irrigation adapté.

Plein champ :

L'irrigation par **aspersion** est préférable par rapport au goutte-à-goutte. Toutes les cultures du jardin concerné seront irriguées de la même manière par les asperseurs. A noter que le mulch limite l'évaporation de l'eau du sol (par rapport au sol nu).


Sous abris :

L'irrigation par goutte-à-goutte est à proscrire. Les **micro-asperseurs** au sol permettent d'irriguer les plants tout en humidifiant le mulch, et sans risque de maladies liées à une irrigation aérienne.



Céleris en Plein champ

L'implantation est rapide à la main sur le mulch d'herbe. De plus, la dégradation du mulch procure un **"effet booster"** aux jeunes plants en début de croissance (voir [film MTH #2](#)).



Tomates Sous abris

Pour les cultures estivales, l'enjeu de réchauffement du sol prime sur la nutrition des plants en début de croissance. L'épandage se fait environ un mois après la plantation.

Pour en savoir plus, contactez-nous :
giulia.tosca@educagri.fr - 02 33 76 80 50 - www.maraichage-tout-herbe.fr