

Haricot de Pont-Audemer

Phaseolus vulgaris L.

Description : Ancienne variété du Lieuvin cultivée jusque dans les années 60, cet haricot à écosser se consomme entre vert /sec et sec. Il était autrefois cuisiné en potée avec de l'agneau.

Le haricot de Pont-Audemer est un haricot nain, de gousses et de grains à maturités blancs et striés roses. Ce haricot est très parfumé et peut être commercialisé en sec ou demi-sec.


Implantation : en plein champ, si semis mi-juin à mi-juillet alors récolte en demi-sec. Sinon semer fin mai au plus tard pour du coco sec

Inscription au catalogue variétal : Non



Thomas Pires, 2024

Calendrier



Infos techniques

- Durée de levée :** 6 à 8 jours
- Durée de cycle :** 100 à 110 jours
- Densité de semis :** 20 à 30 graines/m²
5 à 10 cm ou 3 graines en poquet tous les 30 cm sur le rang et 40 à 60 cm entre le rang
- Profondeur du semis :** 3 cm
- Vigueur du plant :** bonne
- Intervention en cours de cycle :** désherbage

- NPK de référence :** 170 - 50 à 80- 200
- irrigation :** 200 mm sur toute la durée du cycle et plus particulièrement à la levée et au moment de la floraison pour la formation des gousses. Un stress hydrique à cette période aura un impact sur la production et entraînera le développement important de fil.
- Résistance/sensibilité :** pourriture en fin de suite à cause de la verse des plants arrivé à maturité

Récolte

- Calibre :** gousses de 12 à 15 cm de longueur ; grains rectangulaires de 2 cm de longueur environ
- Rendement :** 10 gousses/plant et en moyenne 6 grains/gousses pour un poids moyenne de 70 à 100g/pied
- Conservation :** Vendu en demi-sec ou séchage sous abri pour vente en sec

